



AGROCHIMICA

Fertiltan G

Fertilizzante correttivo granulare 1-2 mm consentito in agricoltura biologica

Il tannino di castagno idrolizzato è un prodotto naturale ottenuto mediante l'estrazione in acqua dal legno di castagno non trattato. Il sistema di estrazione negli impianti da noi utilizzati è un processo industriale brevettato che conserva integre le caratteristiche dei polifenoli contenuti nel tannino. Aiuta l'assimilazione da parte delle piante degli elementi nutritivi ed in particolar modo dei microelementi in quanto il tannino è un complessante naturale. DOSI DI IMPIEGO: Per via radicale: 15 – 50 kg/ha a trattamento ogni 15/20 giorni a seconda della gravità del problema. Si consiglia di effettuare il primo trattamento in pre semina – trapianto. Diluire il prodotto in abbondante volume d'acqua. Si consiglia di sciogliere il tannino in una soluzione acida, pH 4/5 se possibile acqua piovana od osmotizzata. Prima di miscelare il tannino con altri prodotti è consigliabile verificarne la compatibilità. Non miscelare con prodotti contenenti calcio.

Composizione

Tannino sul tal quale	75%
Carbonio organico	50%
pH	3,5

Confezioni disponibili

Tipo di confezione	Volume	Confezioni / bancale
Sacco di plastica	20 Kg	25